



Factsheet

Anticonceptie- gebruik en onbedoelde zwangerschap

Deze factsheet geeft inzicht in onbedoelde en ongewenste zwangerschap in Nederland en het gebruik van methoden om dit te voorkomen. Waar mogelijk laten we trends zien.

Inhoud

Anticonceptiegebruik eerste keer	3
Huidig anticonceptiegebruik	4
Kans op onbedoelde zwangerschap	6
Gebruik natuurlijke methoden om zwangerschap te voorkomen	7
Anticonceptiegebruik door mannen	8
Gebruik morning-afterpil	10
Houding tegenover een zwangerschap op dit moment	11
Ervaring met (onbedoelde en/of ongewenste) zwangerschap	12
Anticonceptiegebruik bij onbedoelde zwangerschap	14
Abortus	15


Anticonceptiegebruik eerste keer

91% van de jongeren gebruikte bij de eerste keer penis-in-vagina seks een anticonceptiemethode.

Een condoom wordt nog iets vaker gebruikt dan de pil bij de eerste keer seks.

Ongeveer een derde van de jongeren gebruikt zowel de pil als een condoom.

Anticonceptiegebruik bij de eerste keer penis-in-vagina seks (%)



**) De jongens en meiden zijn niet elkaars partner, dus hun rapportages verschillen. De eerste keer van een meisje is niet per se ook de eerste keer van de jongen waarmee ze seks had en andersom.*

Percentages tellen niet op tot 100% i.v.m. meerdere antwoorden mogelijk.

- Ongeveer een derde van de jongeren gebruikte bij de eerste keer penis-in-vagina seks zowel een condoom als andere anticonceptie.
- Jongens gebruikten vaker geen anticonceptie bij de eerste keer seks als ze 14 jaar of jonger waren.

- Jongeren voor wie het geloof heel belangrijk is gebruikten minder vaak een anticonceptiemethode.
- Wanneer de eerste keer vaginale seks met een vaste partner is, wordt er ook vaker anticonceptie gebruikt dan met een losse partner. Bij een losse partner gebruikt 12% van de jongens en 14% van de meiden niets bij de eerste keer vaginale seks.

Bron: Seks onder je 25^e 2023

Huidig anticonceptiegebruik

We rapporteren het huidige gebruik van anticonceptiemethoden onder vrouwen die ooit penis-in-vagina seks hebben gehad. Het kan zijn dat deze vrouwen nu geen penis-in-vagina seks hebben. Er kan ook een andere reden zijn om anticonceptie te gebruiken dan om zwangerschap te voorkomen.

Definities:

Anticonceptiemethode: de pil, condooms, spiraaltje, prikpil, hormoonstaafje, pleister, vaginale ring, pessarium, sterilisatie.

Natuurlijke methode: terugtrekken voor het klaar-komen of het toepassen van een vruchtbarheidsdagmethode en geen (onbeschermde) penis-in-vagina seks hebben op de vruchtbare dagen.

Van de meiden van 13-16 jaar die ooit penis-in-vagina seks hebben gehad, gebruikt 72% een anticonceptiemethode.

Van de meiden van 17-24 jaar die ooit penis-in-vagina seks hebben gehad, gebruikt 80% een anticonceptiemethode.

De groep 17-24 jarige meiden die wel ervaring heeft met penis-in-vagina seks maar momenteel geen anticonceptie gebruikt, is gegroeid van 12% in 2017 naar 20% in 2023.

Bron: Seks onder je 25^e 2023


Van de vrouwen van 25-39 jaar die ooit penis-in-vagina seks hadden, gebruikt 59% een anticonceptiemethode.

Van de vrouwen van 40-49 jaar die ooit penis-in-vagina seks hadden, gebruikt 47% een anticonceptiemethode.

De groep vrouwen in de leeftijd 18-49 jaar die wel ervaring heeft met penis-in-vagina seks maar geen anticonceptie gebruikt, is gegroeid van 34% in 2017 naar 41% in 2023.


Bron: Monitor Seksuele Gezondheid 2023

Anticonceptiegebruik onder meiden die ooit penis-in-vagina seks hadden (%)



Bron: Seks onder je 25^e 2023

Anticonceptiegebruik onder volwassen vrouwen die ooit penis-in-vagina seks hadden (%)



- De pil wordt minder populair naarmate vrouwen ouder worden. Jonge meiden beginnen vaak met de pil, deels in combinatie met condooms, en een deel stapt later over op een hormoonspiraaltje, condooms of een koperspiraaltje.
- Na de pil en het spiraaltje is het condoom de meest gebruikte anticonceptiemethode onder volwassen vrouwen. Het condoomgebruik is het hoogst in de leeftijdscategorie 25-39 jaar.
- Het gebruik van andere anticonceptiemiddelen, zoals de prikpil, pleister, de anticonceptivering en het anticonceptiestaaftje blijft relatief laag, in alle leeftijdsgroepen.

Bron: Monitor Seksuele Gezondheid 2023

Naarmate vrouwen ouder worden gebruiken ze vaker geen vorm van anticonceptie. Dit kan zijn omdat ze zwanger willen worden, zwanger zijn (vooral 25-34 jarigen), of niet zwanger kunnen worden (vooral 40-49 jarigen). Maar het kan ook zijn dat ze de laatste tijd geen penis-in-vagina seks hebben. Dit wordt vooral gezegd door vrouwen van 18-24 jaar.

Meer dan de helft van de meiden tot 25 jaar die geen anticonceptie gebruiken geeft als reden geen hormonen te willen gebruiken, een derde van hen vanwege bijwerkingen.

Onder vrouwen tussen de 18 en 49 jaar geeft een derde de hormonen als reden om geen anticonceptie te gebruiken. Door vrouwen tussen de 25-39 jaar wordt vaker dan in andere leeftijdsgroepen last van bijwerkingen als reden gegeven.

Bronnen: Seks onder je 25^e 2023, Monitor Seksuele Gezondheid 2023

Kans op onbedoelde zwangerschap

Het is lastig om precies te zeggen hoeveel vrouwen en hun partners kans hebben op een onbedoelde of ongewenste zwangerschap. De beste maatstaf om iets te zeggen over de kans op onbedoelde zwangerschap is het percentage vrouwen dat vruchtbaar is, penis-in-vagina seks heeft gehad in het afgelopen jaar, nu geen anticonceptiemiddel gebruikt en niet zwanger is of wil worden.

Dit kan echter een over- of onderrapportage zijn, want:

- niet alle vrouwen hebben de laatste tijd penis-in-vagina seks
- vrouwen die geen anticonceptie gebruiken, kunnen wel andere methoden toepassen om niet zwanger te raken
- als een vrouw wél anticonceptie gebruikt, kan er ook iets mis gaan in het gebruik of de anticonceptie kan falen

Onder meiden tot 25 jaar heeft 1 op de 20 (5%) mogelijk kans op een onbedoelde zwangerschap.

De meeste meiden die mogelijk kans hebben op onbedoelde zwangerschap zijn 22-24 jaar (9%).

Er is hierbij geen verschil naar opleidingsniveau en geloof.

Bron: Seks onder je 25^e 2023

In de groep volwassen vrouwen van 18 tot en met 49 jaar loopt 1 op de 8 (12%) mogelijk kans op een onbedoelde zwangerschap.

De meeste vrouwen die mogelijk kans hebben op onbedoelde zwangerschap zijn 25-29 jaar (14%).

Geloof speelt hier wel een rol: voor de meeste vrouwen die mogelijk kans hebben op onbedoelde zwangerschap is het geloof een beetje belangrijk (ten opzichte van niet of heel belangrijk).

Bron: Monitor Seksuele Gezondheid 2023

Kanttekeningen:

- Het percentage vrouwen dat kans loopt op een onbedoelde zwangerschap zegt niets over het aantal mannen dat iemand onbedoeld zwanger kan maken
- Een onbedoelde zwangerschap is niet altijd een ongewenste zwangerschap, of kan veranderen van ongewenst naar gewenst

Gebruik van natuurlijke methoden om zwangerschap te voorkomen

Als vrouwen geen anticonceptie gebruiken, zou het kunnen zijn dat ze andere methoden toepassen om zwangerschap te voorkomen.

Uit aanvullend onderzoek door Rutgers onder vrouwen tussen de 18 en 30 jaar blijkt dat 14% een zogenoemde natuurlijke methode gebruikt om zwangerschap te voorkomen:


- 4% doet aan terugtrekken voor het klaarkomen
- 10% past een vruchtbaardagen-methode toe

Aangezien hier voor het eerst onderzoek naar is gedaan kunnen we niet zeggen of het gebruik van natuurlijke methoden is toegenomen.

De belangrijkste redenen om natuurlijke methoden te gebruiken zijn:

- Geen hormonen willen gebruiken, al dan niet vanwege bijwerkingen of angst voor gezondheidsrisico's
- In contact willen zijn met het lichaam en de natuurlijke cyclus

Wie of wat heeft geholpen bij de keuze voor natuurlijke methoden?



Bron: Van de Pijl et al., 2024

- De partner is voor vrouwen de belangrijkste hulp geweest om te kiezen voor een natuurlijke methode, en daarna vriendinnen en websites.
- Voor vrouwen van 18-24 jaar zijn verhalen op social media vaker dan voor vrouwen van 25-29 jaar een hulp geweest bij de keuze.
- Meer dan de helft van de vrouwen (56%) gebruikt de kalendermethode, al dan niet met behulp van een app. Dit houdt in dat zij de vruchtbare dagen (laten) berekenen op basis van het aantal dagen tussen de menstruaties.
- 61% houdt maximaal 8 risicovolle dagen aan. Een algemeen advies van experts is om 7 dagen voor de verwachte ovulatie tot 2 dagen daarna aan te houden, dus 9 dagen. Afhankelijk van de regelmaat van de cyclus en de gebruikte methode(s) is de eisprong preciezer of minder precies te voorspellen. Een eikel leeft ongeveer 24 uur, maar zaadcellen kunnen tot wel 5 dagen overleven in de baarmoeder.
- Op de vruchtbare dagen gebruikt 62% een condoom of pessarium, 25% heeft op die dagen geen penis-in-vagina seks en 12% trekt dan terug voor het klaarkomen. 1% gebruikt een morning-afterpil na seks op de vruchtbare dagen.



Anticonceptiegebruik door mannen

De meeste anticonceptiemethoden moeten door vrouwen worden gebruikt. Er zijn twee anticonceptiemethoden voor mannen om een onbedoelde zwangerschap te voorkomen: het condoom en sterilisatie (vasectomie).

Wanneer mannen een condoom gebruiken, kan dit zijn om soa's te voorkomen, om zwangerschap te voorkomen of beide. Het kan zijn dat de partner (ook) een anticonceptiemiddel gebruikt.

Condoom


Bij penis-in-vagina seks zonder condoom met wisselende sekspartners is het risico op een soa én op een zwangerschap hoger dan met een vaste sekspartner. Bij een onenightstand kan een man niet zeker weten of de vrouw een anticonceptiemethode gebruikt en juist gebruikt.

Bij de laatste onenightstand gebruikte in totaal 43% van de jongens in de leeftijd 16-25 jaar geen condoom.

Onder de brede groep volwassenen in de leeftijd 18-80 jaar gebruikte eveneens in totaal 43% van de mannen geen condoom bij de laatste onenightstand.

- Na de leeftijdsgroep 70-80 jaar is het percentage mannen dat geen condoom gebruikte als de laatste sekspartner een onenightstand was, het hoogst in de leeftijdsgroep 25-39 jaar: 54%. Dit is een significant hoger verschil met de andere leeftijdsgroepen (de leeftijdsgroep 70-80 jaar buiten beschouwing gelaten).


Geen condoom bij de laatste sekspartner, onenightstand (mannen 18-80 jaar, %)



Bron: Monitor Seksuele Gezondheid 2023

- Bij seks met een vaste partner gebruikte 8% van de mannen in de leeftijd 18-80 jaar altijd een condoom. Dit lijkt een goede indicatie van het gebruik van het condoom als anticonceptiemiddel door mannen. Van de vrouwen tussen de 18 en 49 jaar zegt 11% het condoom als anticonceptiemiddel te gebruiken.
- In de leeftijdsgroep 18-24 jaar gebruiken mannen significant vaker dan in andere leeftijdsgroepen altijd een condoom met een vaste partner, namelijk 21%.

Altijd een condoom bij een vaste partner, (mannen 18-80 jaar, %)



Bron: Monitor Seksuele Gezondheid 2023

- Er is een toename van het percentage mannen en vrouwen dat nooit een condoom gebruikte met de laatste losse sekspartner: van 40% in 2017 naar 48% in 2023.
- Er is eveneens een toename van het percentage mannen en vrouwen dat nooit een condoom gebruikte met de laatste vaste partner: van 39% in 2017 naar 51% in 2023.

Bron: Monitor Seksuele Gezondheid 2023

Sterilisatie


Volgens cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) laten jaarlijks zo'n 15.000 à 16.000 mannen zich steriliseren. Dit betreft de medisch-specialistische ingrepen in ziekenhuizen. Er zijn ook privéklinieken die sterilisaties uitvoeren, en huisartsen doen dit ook zelf.

Bron: Opendisdata.nza.nl, geraadpleegd op 30 januari 2025



- Bij minder dan 0,1 op de 1.000 mannen per jaar doet de huisarts de ingreep zelf.
- Bij de meeste huisartsconsulten over sterilisatie gaat het om mannen in de leeftijd 35-44 jaar.
- De lichte toename van het aantal consulten onder 35-39 jarige en 40-44 jarige mannen is niet significant ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen.

Consulten over sterilisatie bij de huisarts per 1.000 mannen per jaar



Bronnen: Nivel.nl, geraadpleegd op 30 januari 2025, Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2023 en trendcijfers 2019-2023, Nivel 2024

Gebruik morning-afterpil

Het gebruik van de morning-afterpil is toegenomen onder seksueel ervaren meiden tot 25 jaar: van 12% in 2017 naar 17% in 2023.

In de groep 13-17 jaar was de stijging het grootst.

- Onder meiden van 13 tot en met 24 jaar die ervaring hebben met penis-in-vagina seks heeft 17% in het afgelopen jaar de morning-afterpil geslikt: 13% één keer, 4% meerdere keren. In de leeftijd 13-18 jaar wordt de morning-afterpil het meest gebruikt. Er is geen verschil naar opleidingsniveau en geloof.

Bron: Seks onder je 25^e 2023



Ook onder het totale aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd van 18 tot en met 49 jaar is het gebruik van de morning-afterpil in 2023 iets toegenomen ten opzichte van 2017: van 5% naar 7%.

- Van de vrouwen van 18 tot en met 49 jaar die in de afgelopen 12 maanden penis-in-vagina seks hadden, heeft 7% in het afgelopen jaar minstens één keer de morning-afterpil geslikt. In de leeftijdsgroep 18-24 jaar werd de morning-afterpil het meest gebruikt. Single vrouwen of vrouwen in een LAT-relatie slikten vaker de morning-afterpil in vergelijking met vrouwen die samenwonen of getrouwd zijn. Er is geen verschil naar opleiding en geloof.

Bron: Monitor Seksuele Gezondheid 2023

Houding tegenover een zwangerschap op dit moment

Ruim twee derde van de seksueel ervaren jongeren tot 25 jaar zou een zwangerschap op dit moment vervelend vinden. Eén op de tien jongeren zou dit leuk vinden.

- Meiden van 22 tot en met 24 jaar vinden het vaker leuk om nu zwanger te raken in vergelijking met jongere meiden.
- De houding tegenover een zwangerschap is positiever onder praktisch opgeleide jongeren en jongeren voor wie het geloof heel belangrijk is.
- Ook relatiestatus speelt een rol: 11% van de jongens en 14% van de meiden tot 25 jaar met een vaste partner zou een zwangerschap nu leuk vinden, tegenover respectievelijk 6 en 7% onder single jongens en meiden.

Bron: Seks onder je 25^e 2023



Onder mannen en vrouwen tussen de 25 en 49 jaar heeft 20% van de vrouwen en 19% van de mannen een kindwens. 7% van zowel de mannen als de vrouwen probeert deze kindwens momenteel te realiseren.

- Vergeleken met 2017 hebben in 2023 iets minder mannen en vrouwen een kindwens en de groep die wel een kindwens heeft maar deze niet probeert te realiseren, is iets gegroeid.
- Mannen en vrouwen van 25-49 jaar die theoretisch zijn opgeleid hebben iets vaker een kindwens maar proberen deze niet te realiseren in vergelijking met praktische opgeleiden.

Bron: Monitor Seksuele Gezondheid 2023

Ervaring met (onbedoelde en/of ongewenste) zwangerschap

In Seks onder je 25e 2023 en Monitor Seksuele Gezondheid 2023 is gevraagd naar 'onbedoelde zwangerschap', wat niet hetzelfde is als een 'ongeplande zwangerschap', waar in sommige andere onderzoeken naar is gevraagd. Vervolgens is gevraagd of de onbedoelde zwangerschap gewenst of ongewenst was. Een zwangerschap kan aanvankelijk ongewenst zijn en later wel gewenst worden. Dit konden respondenten aangeven. Deze zwangerschappen telden dan niet mee als ongewenst.

We zien enkele significante verschillen in kenmerken van groepen waarbij onbedoelde en/of ongewenste zwangerschappen vaker voorkomen.

Ervaring van jongeren 16-24 jaar ooit met zwangerschap

2% van de jongens en 2% van de meiden in de leeftijd 16-24 jaar heeft ooit te maken gehad met een onbedoelde zwangerschap, en 1% van zowel de jongens als de meiden met een ongewenste zwangerschap.

- Jongeren in de leeftijd 22 tot en met 24 jaar hebben vaker te maken gehad met een zwangerschap, en ook met onbedoelde en/of ongewenste zwangerschappen, dan jongeren van 16-21 jaar.

- Jongeren met een praktische opleiding hebben vaker te maken gehad met een zwangerschap, die voor de meiden ook vaker onbedoeld of ongewenst was.
- Meiden voor wie het geloof heel belangrijk is zijn iets vaker zwanger geweest dan niet-gelovige meiden.

De onbedoelde zwangerschappen waren voor 18% van de jongens en 39% van de meiden het gevolg van het achterwege laten van anticonceptie. Als er wel anticonceptie was gebruikt ging daarbij iets mis (bijvoorbeeld pil vergeten, condoom gescheurd) of de methode faalde. Geen enkele methode is 100% betrouwbaar.

Deze demografische kenmerken maken echter niet dat iemand kwetsbaar is of tot de doelgroep van het programma Nu Niet Zwanger behoort. Dat programma is namelijk gericht op het proactief in gesprek gaan over de kindwens met mensen die in kwetsbare omstandigheden leven en in beeld zijn bij de hulpverlening.

Ervaring met (onbedoelde en/of) ongewenste zwangerschap (% jongeren van 16-24 jaar)

	Jongens (n=3463)	Meiden (n=4577)	Totaal (n=8040)
Zwangerschap	2,4	3,2	2,8
Onbedoelde zwangerschap	1,8	1,8	1,8
Ongewenste zwangerschap	1,4	1,0	1,2

Verschuivingen in ervaring met (onbedoelde en/of ongewenste) zwangerschap (% jongeren van 17-24 jaar)

	Jongens		Meiden	
	2017	2023	2017	2023
	n=5896	n=3146	n=9800	n=4233
Zwangerschap	2,6	2,6	4,9	3,5 ▽
Onbedoelde zwangerschap	2,4	2,0	3,5	2,0 ▽
Ongewenste zwangerschap	1,9	1,5	1,9	1,0 ▽

▽/△ = lager/hoger dan de voorgaande editie, zeer klein verschil.

- In de leeftijdsgroep 17 tot en met 24 jaar zijn de ervaringen met zwangerschap tussen 2017 en 2023 te vergelijken. Meiden rapporteren in 2023 iets minder vaak ervaring met een zwangerschap, en ook met onbedoelde en ongewenste zwangerschap, dan in 2017.

Ervaring volwassenen 18-49 jaar in het afgelopen jaar:

11 op de 1000 mannen en 10 op de 1000 vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met een onbedoelde zwangerschap. Voor 3 op de 1000 mannen en 4 op de 1000 vrouwen was de zwangerschap ongewenst.

Bron: Seks onder je 25^e 2023

13% van de zwangerschappen onder volwassenen van 18-49 jaar was onbedoeld, en 38% van die onbedoelde zwangerschappen was ook ongewenst.

Ervaring met (onbedoelde en ongewenste) zwangerschap in het afgelopen jaar (% volwassenen van 18-49 jaar)

	Mannen (n=4460)	Vrouwen (n=6005)	Totaal (n=10465)
Zwangerschap	8,0	7,7	7,9
Onbedoelde zwangerschap	1,1	1,0	1,0
Ongewenste zwangerschap	0,3	0,4	0,4

- Vrouwen en mannen tussen de 18-24 jaar hadden het afgelopen jaar het minst te maken met een zwangerschap, vrouwen en mannen in de leeftijd 25-39 jaar het meest. Voor vrouwen

tussen de 25-39 jaar was de zwangerschap iets vaker onbedoeld in vergelijking met vrouwen van 18-24 jaar en 40-49 jaar.

Verschuivingen in ervaring met (ongewenste) zwangerschap in het afgelopen jaar (% volwassenen van 25-49 jaar)

	Mannen		Vrouwen		Totaal	
	2017	2023	2017	2023	2017	2023
	n=690	n=1692	n=959	n=2259	n=1649	n=3951
Zwangerschap	11,4	10,1	11,1	9,4	11,2	9,7 ▽
Ongewenste zwangerschap	0,4	0,3	1,7	0,5 ▽	1,2	0,4 ▽

▽/△ = lager/hoger dan 2017, $p < .01$, Cramer's $V < .10$.

- Het aantal zwangerschappen, en ook het aantal ongewenste zwangerschappen, is in 2023 iets verminderd ten opzichte van 2017.

anticonceptie te hebben gebruikt. 39% had soms anticonceptie gebruikt, er was iets mis gegaan of men weet het niet meer.


Anticonceptiegebruik bij onbedoelde zwangerschap:

Bron: Monitor Seksuele Gezondheid 2023*

- In de meeste gevallen ontstaat een onbedoelde zwangerschap terwijl er wél een methode wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen.
- Iets minder dan de helft (48%) van de mannen en vrouwen die te maken kregen met een onbedoelde zwangerschap, gaf aan dat er geen anticonceptie was gebruikt. 14% gaf aan altijd

- Onder abortuscliënten had 41% niets gedaan of gebruikt om een zwangerschap te voorkomen. De meesten zijn zwanger geraakt terwijl zij een vruchtbarheidsdag-methode of een condoom gebruikten. Een morning-afterpil staat op de derde plaats, en daarna de pil. N.B.: dit onderzoek is mogelijk niet representatief voor de totale abortuspopulatie.

Wat deed of wat gebruikte je in de maand voorafgaand aan je zwangerschap?* (n=250)



- Driekwart van de abortuscliënten gaf aan dat er iets mis was gegaan met de methode of dat ze de methode niet goed hadden gebruikt.
- Driekwart van de abortuscliënten die een vruchtbarheidsdagmethode toepasten, hanteerden minder dan 9 risicovolle dagen.

- Bijna de helft van de vrouwen die geen methode gebruikten (49%), gaf aan dat ze niet over een eventuele kans op zwangerschap nagedacht hadden, of dat ze dachten dat er geen kans was.

* Tet op boven 100% i.v.m. meerdere antwoorden mogelijk


Bron: Finkenflügel, 2024

Abortus

Het werkelijke aantal abortussen in verschillende leeftijdscategorieën zijn te halen uit de jaarlijkse rapportage Wet Afbreking zwangerschap (Wafz). De populaties uit de monitors van Rutgers zijn te klein om uitsplitsingen te maken naar leeftijd.

In 2022 is voor het eerst een stijging van 4560 te zien in het aantal zwangerschapsafbrekingen. Die stijging zet in 2023 door, met een stijging van 3720 abortussen. Het totaal aantal zwangerschapsafbrekingen in 2023 komt daarmee uit op 39.332. Tot 2022 lag het aantal abortussen gemiddeld rond de 31.000.

Abortusaantallen per leeftijdscategorie



Bron: Jaarrapportage 2023 Wet afbreking zwangerschap (Wafz), IG&J, 2024



- De meeste zwangerschapsafbrekingen vonden plaats in de leeftijdscategorieën 25-34 jaar, maar de stijging is in alle leeftijdscategorieën te zien.
- Het aantal buitenlandse vrouwen dat in 2023 in Nederland een zwangerschap liet afbreken, is nagenoeg gelijk gebleven.
- Veruit de meeste zwangerschapsafbrekingen vonden ook in 2023 plaats in het eerste trimester, tot 13 weken zwangerschap (87%). 69% van de abortussen vond plaats in de eerste 8 weken.
De zwangerschapsduur wordt berekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie.
- De grootste stijging in het aantal abortussen is te zien bij 6 weken zwangerschap.

Bron: Jaarrapportage 2023 Wet afbreking zwangerschap (Wafz), IG&J, 2024

